

Basal behandling vuxen

Hitta i dokumentet

[Indikationer för behandling](#)
[Behandling](#)
[Omvårdnad](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Basal behandling av vuxen för ambulanssjukvården Halland.

Indikationer för behandling

Symptomatisk behandling.

Behandling

BASAL BEHANDLING – vuxen

- Fri luftväg. I första hand basala åtgärder (käklyft, mun-svalgtub/näskantarell, rensugning, Heimlich's manöver).
- Obs! Vid trauma stabilisera halsrygg.
- Assistera andningen vid behov (AF <10 eller >30/min, ytlig andning), normoventilation eftersträvas (vuxen 10/min).
- **Andningsoxygen** 1-2 l/min vid SpO₂ <94. Vid otillräcklig effekt, omätbart SpO₂ eller trauma, ge oxygen 10-15 l/min på reservoarmask.
- Vid kritiskt sjuk patient med påverkade vitalparametrar snabb avtransport inom 10 min till sjukhus och behandla under färd.
- Venväg alternativt intraosseös access vid förväntat behov av intravenöst/intraosseöst läkemedel eller vätska.
- **Inf. Ringer-acetat**, 500 ml infunderas vid syst BT <90. Kan upprepas 4 ggr.
- **Inj. Atropin** 0,5 mg/ml, 1 ml i.v. vid symtomgivande bradykardi
- Skapa lugn och ro, skydda patienten mot avkylning och trycksår. Känns patienten het - överväg avklädning/kylning.
- **Inj. Morfin** 1 mg/ml, 2,5 ml i.v., (om syst BT ≥90 mm.Hg) vid smärta, VAS ≥4. Upprepas till smärtfrihet.
- **Inj. Ondansetron 2mg/ml**, 2 ml iv/i.o. ges vid illamående/kräkning.
- Täck öppna sår. Stoppa blödning med direkt tryck eller tourniquet vid indikation.
- Utvärdera/dokumentera effekt av given behandling.

Omvårdnad

BASAL ÖVERVAKNING I SAMBAND MED AMBULANSTRANSPORT

Andningsfrekvens (Viktigast - mest prediktivt)

Medvetandegrad (också prediktivt)

Saturation

Puls

Blodtryck

Utvärdering**BASALA BEHANDLINGSMÅL**

Fri luftväg

Andningsfrekvens 10-20

Saturation (SaO₂) 94-98%

Systoliskt blodtryck 90 mmHg eller högre

VAS 3 och lägre

**VITALPARAMETRAR SKALL MÄTAS OCH DOKUMENTERAS VID VARJE
AMBULANSUPPDRAG.**

**EN BEDÖMNINGSKOD SKALL SÄTTAS VID VARJE AMBULANSUPPDRAG.
PATIENT SOM GES RETTS-KOD RÖD ELLER ORANGE OCH/ELLER OM
LÄKEMEDEL (OXYGEN UNDANTAGET) HAR GIVITS ELLER FÖRVÄNTAS
KOMMA ATT ANVÄNDAS UNDER UPPDRAGET SKALL VÅRDAS AV
SJKSKÖTERSKA.**

**Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående
version.**

Gäller från och med 2015-12-01.