

Brännskada

Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)
[Behandling](#)
[Omvårdnad](#)

[Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående version.](#)

Sammanfattning

Ansiktsbrännskador eller brännskador i luftvägarna kan snabbt ge andningsproblem. Om kritiskt skadad – prioritera avtransport och behandla under färd.

Behandling

Läkemedel

Andningsoxygen minst 10 l/min på reservoarmask. Sträva efter högsta möjliga FiO₂ om risk för CO- eller cyanid-förgiftning.

Ringer-acetat infunderas (max 2000 ml). Brännskador ger aldrig chockbild i tidigt skede, överväg i så fall andra skador.

Salbutamol 2 mg/ml inhalation 5 ml vid hosta, luftvägssymtom.

Esketamin, Ketanest, injektionsvätska 5mg/ml och 25mg/ml.

- 0,25 mg/kg i.v. vid svår smärta.
- Om i.v. eller i.o. väg saknas kan Ketanest 25mg/ml ges i.m. i dosen 0,5mg/kg.

50kg-12,5mg i.v.-25mg i.m.

70kg och mer-17,5mg i.v.-35mg i.m.

Kan upprepas efter 10 min. Kan upprepas max 3 gånger.

Diazepam injektionsvätska 5 mg/ml, 0,5 ml ges i.v. före Ketanest. Kan upprepas till max 2 ml.

Morfin injektionsvätska, 10 mg/ml spädd med NaCl till 1 mg/ml, 2,5 ml i.v. Kan upprepas tills tillfredsställande VAS. Försiktighet vid påverkad medvetandegrad och/eller instabil cirkulation.

Ondansetron injektionsvätska 2 mg/ml, 2ml kan ges långsamt i.v. som engångsdos vid illamående.

Paracetamol tablett 500 mg, 2-3 st. per os, om patienten väger över 60kg. Om under 60 kg, 2 tabletter. Överskrid ej max dygnsdos.

Omvårdnad

Skapa lugn och ro för patienten.

Kyl brännskadan men håll patienten varm!

Ytlig brännskada kan täckas med brännskadegel eller brännskadekompress till max 10 % av kroppsytan. Behandla till smärtfrihet, max 15 min, inspektera, upprepa vid behov.

Alternativt kan NaCl eller Ringeracetat sprayas över det skadade området.

Finfördelad dimma kyler effektivt och ger en bra smärtlindring. Dimma är att föredra framför att hälla vätska över skadan.

Djup brännskada skyddas med rena dukar efter kylning

Vid frätskador endast vatten, Ringeracetat eller NaCl, inte brännskadegel
Höjd huvudända
Högläge på brända extremiteter
CPAP-behandla vid misstänkt lungödem
EKG rytmövervakning vid elbrännskada

Uppdaterat från föregående version- Esketamin kan upprepas efter 10 minuter- max 3 gånger. Paracetamol tillagd.

Gäller från och med 2015-12-01