

Trauma- allmänt

Hitta i dokumentet

[Behandling](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Följ PS-konceptet och utse vid behov ledningsenhet med Sjukvårdsledare och Medicinskt ansvarig. Medicinskt ansvarig tar aktiv del i beslut kring losstagnung. 2 eller flera skador i minst 2 skilda delar av kroppen orsakat av olycksfall = multitrauma=kritiskt skadad patient. Minimera antalet åtgärder på fältet. Om kritiskt skadad – prioritera avtransport och behandla under färd.

Följ PHTLS flödesschema, undersök och dokumentera:

A: Fri luftväg, stabilisera halsryggen om indicerat. Intubation skall i princip inte göras.

B: Eftersträva normoventilation, assistera vid ytlig eller långsam andning(<10 andetag/ min)

C: Stabilisera/säkerställ cirkulationen, stoppa yttre blödning. Höjda ben.

D: Immobilisering. Grovreponering av frakturer.

E: Förhindra nedkylning. Täck öppna sår/skador.

Minst följande skall dokumenteras:

Luftvägar-Andning: Andningsmönster, frekvens, SpO2

Cirkulation: Puls, blodtryck, kapillär återfyllnad

Neurologiskt: Medvetande grad (RLS eller GCS, pupillreaktion, grov neurologi)

Larm till sjukhus ska ske enligt kriterier för traumalarm.

Behandling

Läkemedel

Andningsoxygen 10 l/min på reservoarmask

Ringer-acetat (max 2000 ml) infunderas om PVK/I.o kan sättas.

Eftersträva systoliskt blodtryck 80-90 mmHg. Vid samtidig skallskada helst 90-100 mmHg.

Esketamin, Ketanest injektionsvätska 5 mg/ml och 25 mg/ml.

- 0,25 mg/kg ges i.v. vid svår smärta.
- Om i.v eller i.o. väg saknas kan Ketanest 25 mg/ml ges i.m. i dosen 0,5mg/kg

50 kg-12,5 mg i.v.-25 mg i.m.

70 kg eller mer-17,5 mg i.v.- 35 mg i.m.

Kan upprepas efter 10 minuter. Kan upprepas max 3 gånger.

Diazepam injektionsvätska 5 mg/ml, 0,5 ml ges i.v. före Ketanest. Dosen kan upprepas till max 2 ml.

Morfin injektionsvätska, 10 mg/ml spädd med NaCl till 1 mg/ml, 2,5 ml i.v. ges som komplement till Ketanest. Dosen kan upprepas tills tillfredsställande VAS.

Försiktighet vid påverkad medvetandegrad och/eller instabil cirkulation.

Ondansetron injektionsvätska 2 mg/ml, 2ml kan ges långsamt i.v. som engångsdos vid illamående.

Oxygen/lustgas kan användas i väl ventilerad miljö = utanför sjukhytten.

**Uppdaterat från föregående version-Ketanest kan upprepas efter 10 min.
Ketanest kan upprepas 3 gånger.**

Gäller från och med 2015-12-01