

# Drunkningstillbud hos barn

---

## Hitta i dokumentet

[Indikationer för behandling](#)  
[Behandling](#)  
[Omvårdnad](#)

[MeSH-ord](#)

---

## Indikationer för behandling

Symptomatisk behandling

## Behandling

Behandling av livlös patient

HLR/A-HLR ända till mottagande sjukhus om tiden under vatten är <1 timme.

Behandling och läkemedel till patient med livstecken

A - Fri luftväg, stabilisera halsryggen och immobilisera enl algoritm framför allt vid dyk

B - Eftersträva normoventilation, assistera vid ytlig eller långsam andning

Oxygen flödas med tratt eller reservoarmask för barn

C - Nedkyld patient alltid i måttligt chockläge/dränageläge

PVK/I.o

Ringeracetat som bolusdos 20 ml/kg vid hypotension, kan upprepas. Därefter 10 ml/kg

EKG rytmövervakning

D - Bedöm medvetandenivå

Helkroppsfixering vid alla dykolycksfall

E - Förhindra fortsatt nedkylning, tag av blöta kläder

Varmt i sjukhytten, gärna 30 grader C.

## Omvårdnad

Om drunkningstillbud-Immobilisering vid behov

Samtliga dykerolycksfall skall helkroppsfixeras/immobiliseras

EKG- rytmövervakning

Medvetandenivå och neurologiska fynd bedöms och dokumenteras ofta

Förhindra fortsatt nedkylning- tag av blöta kläder. Klä i torra filter. Varm sjukhytt i ambulansen, gärna 30 grader C.

## MeSH-ord

Akutmedicin

Pediatrik

**Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående version.**

Gäller från och med 2015-12-01