

Hypotermi hos barn

Hitta i dokumentet

[Indikationer för behandling](#)
[Behandling](#)
[Omvårdnad](#)
[MeSH-ord](#)

[Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående version.](#)

Indikationer för behandling

Symptomatisk behandling

Behandling

Behandling

A - Fri luftväg

B - Eftersträva normoventilation, assistera vid ytlig eller långsam andning

C - Behandlas i måttligt chockläge, får ej sättas eller resas upp

PVK

E - Förhindra fortsatt nedkylning, tag av blöta kläder

Varmt i sjukhytten, gärna 30 grader C.

Lokal kylskada: isolera med torra, varma kläder, massera inte

Varm dryck till vaken patient som ej skall opereras/sövas

Eventuell HLR ges i normalt tempo. Fortsätt med HLR in till sjukhus om ej effekt av 3 omgångar adrenalin + defibrillering

Läkemedel

Andningsoxygen flödas med tratt eller reservoarmask för barn.

Glucos 50 mg/ml, (om möjligt varm) infusion 10 ml/kg.

Omvårdnad

MeSH-ord

Akutmedicin

Pediatrik

Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående version.

Gäller från och med 2015-12-01