

# INTOXIKATIONER HOS BARN

---

## Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)  
[Utredning och bedömning](#)  
[Indikationer för behandling](#)  
[Behandling](#)

[Omvårdnad](#)  
[MeSH-ord](#)

---

## Sammanfattning

Tänk på din egen säkerhet och kontaminationsrisken!

Ett stort antal ämnen är toxiska för människan, alltifrån endast lättare symptom till dödsfall. I detta dokument redovisas endast principer på behandling vid olika förgiftningssymptom.

## Utredning och bedömning

Anamnes, kontroll av fastställda vitalparametrar samt triagering enligt RETTS-p.

## Indikationer för behandling

Symptomatisk behandling

## Behandling

Behandling - Vaken patient

Frätande ämnen: Ge snarast dryck, gärna mjölk 1-2 dl. Framkalla inte kräkning

Petroleumprodukter: Ge fett, några matskedar gräddolja. Framkalla inte kräkning

Övriga förgiftningar: Om möjligt 100 ml Kolsuspension

Behandling - Medvetandesänkt eller medvetlös patient

Fri luftväg, stabilt sidoläge

Eftersträva normoventilation, assistera vid ytlig eller långsam andning

PVK

## Läkemedel

**Andningsoxygen** flödas med tratt eller reservoarmask för barn.

**EMLA®** på två ställen om > 1år, på 1 ställe om under 1 år

**Ringeracetat**, överväg infusion 20 ml/kg om cirkulatorisk påverkan.

Vid kramper se avsnitt Kramper, barn

**Atropin** injektionsvätska 0,5 mg/ml, 0,02 mg/kg \*(max 1 ml) ges i.v. vid symptomgivande bradykardi. Dosen kan upprepas vid behov:

Barnets vikt i kg	5kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Atropin 0.5 mg/ml iv	0.2 ml	0.4 ml	0.6 ml	0.8 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml

**Naloxon** injektionsvätska 0,4 mg/ml, 0,01 mg/kg ges i.v. vid opioidförgiftning. Dosen kan upprepas vid behov. Kan även ges intranasalt i dosen 1 ml som fördelas i båda näsborrarna.

Barnets vikt i kg	5kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Naloxon 0.4 mg/ml iv	0.1 ml	0.25ml	0.35ml	0.5 ml	0.6 ml	0.7 ml	1 ml	1 ml

**Salbutamol** inhalationslösning 2 mg/ml, ca 0,15 mg/kg ges vid obstruktivitet/bronkospasm efter exponering för retande gaser:

Barnets vikt i kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Salbutamol inh lösn 2mg/ml inhalation	0.5 ml	0.75ml	1 ml	1.5 ml	2 ml	2.25ml	2.5ml	2.5ml

## Omvårdnad

### MeSH-ord

Akutmedicin  
Förgiftning  
Pediatrik  
Allmän pediatrik

**Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående version**

Gäller från och med 2015-12-01