

Ögonskada

Hitta i dokumentet

[Akutfas](#)
[Utredning och bedömning](#)
[Indikationer för behandling](#)

[Behandling](#)

Akutfas

Eventuella andra skador skall hanteras utifrån respektive vårdriktlinje.

Utredning och bedömning

Anamnes, kontroll av fastställda vitalparametrar samt triagering enligt RETTS-a.

Indikationer för behandling

Symptomatisk behandling

Behandling

Fastsittande främmande kropp ska inte tas bort.

Öga som perforerats skall inte sköljas.

Icke penetrerande främmande kropp:

Skölj försiktigt med rikligt med NaCl, 9 mg/ml alternativt Ringeracetat.

Vid behov lyft upp ögonlocket för att kunna spola rent.

Ta ut eventuella kontaktlinser om detta kan göras utan att förvärra skadan.

Etsande/ frätande ämnen i ögon, spolas under hela transporten med **NaCl, 9 mg/ml** alternativt **Ringeracetat**.

Koppla infusionsaggregat och reglera strålen med klämman.

Tetracain ögondroppar 10 mg/ml ges vid svår smärta i ögat. Dosering: 1-2 droppar i berört öga som engångsdos.

Vid tårgasexponering skall hela ansiktet torkas med fuktig duk.

Pepparspray spolas med kallt vatten.

Uppdaterat från föregående version-ingen förändring från föregående version.

Gäller från och med 2015-12-01